



Τ. Δ. : Τέρμα Αμυνταίου – Άγιος Λουκάς
 Τ. Κ. : 651 10 Τ.Θ.: 1235
 Τηλ. : 2510 600431, 2510 244685
 Fax: 2510 600430
 E mail : dpyrgiotou@minagric.gr

Το παρόν δελτίο εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά σε συνεργασία με τις ΔΑΟΚ ΑΜΘ και τη ΔΑΟΚ Σερρών

No 11/24 -04-2020

Πληροφορίες : Δήμητρα Πυργιώτου, Θεόδωρος Μαρκόπουλος, Ιωάννης Διαμαντάκος, Θεοδώρα Γεωργιάδου.

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ

Ευρύτομο Αμυγδαλιάς



Κλωβός (Π.Κ.Π.Φ.Π.&Φ.Ε.-ΚΑΒΑΛΑΣ) στο Ορφάνι



Διαπιστώσεις:

Από επιτόπιους ελέγχους και παρατηρήσεις που έγιναν σε κλωβούς με προσβεβλημένα αμύγδαλα σε διάφορες περιοχές των Ν. Καβάλας και Σερρών, διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η έξοδος του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στις περιοχές Άμπελοι Τριανταφυλλιά και Μεσολακιά του Ν. Σερρών και αναμένεται η έξοδος στο Ν. Καβάλας τις επόμενες ημέρες.

Η έξοδος του εντόμου και η δραστηριότητά του διαρκεί 20 - 25 ημέρες ή και περισσότερο. Το ευρύτομο θεωρείται από του σπουδαιότερους εχθρούς της αμυγδαλιάς και η μη έγκαιρη αντιμετώπισή του μπορεί να επιφέρει μεγάλη οικονομική ζημιά στους αμυγδαλοπαραγωγούς.

Σε επόμενο δελτίο θα σας ενημερώσουμε για την πορεία εξόδου του ευρυτόμου στο Ν.Καβάλας.

Συστάσεις:

Επειδή τα εξειδικευμένα διασυστηματικά εντομοκτόνα για την αντιμετώπιση του ευρύτομου της αμυγδαλιάς στο στάδιο της νεαρής προνύμφης έχουν ανακληθεί, θα πρέπει η καταπολέμηση του εντόμου να γίνει στοχεύοντας στα ενήλικα πριν αυτά προλάβουν να ωοτοκήσουν στους καρπούς.

Συνεπώς συνιστάται στους παραγωγούς να ψεκάσουν τις επόμενες ημέρες στις περιοχές του Ν.Σερρών με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο φυτοπροστατευτικό προϊόν για την αντιμετώπισή του.

Οι ψεκασμοί θα πρέπει να γίνονται κατά τις θερμές ώρες της ημέρας με ηλιοφάνεια όπου παρατηρούνται μεγαλύτεροι πληθυσμοί ενηλίκων ατόμων με επανάληψη κάθε 7-8 ημέρες, μέχρι το στάδιο της σκλήρυνσης του ενδοκαρπίου. Δεν πρέπει να ψεκάσουμε τις ημέρες με συννεφιά γιατί δεν έχουμε έξοδο του εντόμου.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στην ποικιλία Τέξας που θεωρείται ότι είναι πιο ευαίσθητη στην προσβολή του ευρύτομου της αμυγδαλιάς και μπορεί να προκαλέσει πρόωρη καρπόπτωση.

Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες: deltamethrin (2εφαρμογές- ανά 14 ημέρες/30 ημέρες πριν τη συγκομιδή), phosmet (2 εφαρμογές- ανά 14 ημέρες /7 ημέρες πριν τη συγκομιδή), aluminium silicate (4 εφαρμογές-ανά 7 ημέρες, προστατευτικό, απωθητικό εντόμων).

Η εφαρμογή γεωργικών φαρμάκων πρέπει να γίνεται από κατόχους πιστοποιητικού γνώσεων Ο.Χ.Γ.Φ.

Να εφαρμόζονται οι οδηγίες χρήσης με έμφαση στη δοσολογία, συνδυαστικότητα και την τήρηση μέτρων προστασίας του ψεκαστή.

Οι καλλιεργητές μπορούν να συμβουλευούνται για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα ανά καλλιέργεια και παθογόνο την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπ.Α.Α.Τ.

http://www.minagric.gr/syspest/syspest_bfuncs_crops.aspx

✚ Αποστολή του δελτίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση των ενδιαφερομένων μπορεί να γίνει μετά από αίτημα τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις dpyrgiotou@minagric.gr, thmarkopoulos@minagric.gr, idiamentakos@minagric.gr; thgeorgiadou@minagric.gr

✚ το δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων www.minagric.gr



Η Προϊσταμένη Τμήματος

α.α.

Δήμητρα Πυργιώτου