

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΧΘΡΟΣ														ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ.ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
	Ακάρεια	Άσπρη ψώρα	Βαμβρακάδα	Δάκος	Θρίπτες	Καλόκορις	Κοκκοειδή	Κόσσοι	Λεκάριο	Μυτιλόμορφη ψώρα	Παρλατόρια	Πολλίγια	Μαργαρόνια	Πυρηνοτρήτης			Ρυγχίτης
abamectin	✓															2	28(Επιτραπέζιες ελιές) / 30(Πράσινη ελιά Χαλκιδικής)
acetamiprid				✓										✓		2	7
Alpha-cypermethrin				✓												1/2	7(Δολωματικός)
Aluminium silicate				✓												4	Προστατευτικό -απωθητικό
Bacillus thuringiensis														✓		3	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρι και την ημέρα της συγκομιδής
Beauveria bassiana				✓												5	Μόνο για βιολογικές καλλιέργειες
Beta-cyfluthrin				✓		✓		✓						✓	✓	2	14 (Δολωματικός ψεκασμός) & 56 ημέρες με ψεκασμό κάλυψης
Deltamethrin			✓	✓	✓	✓			✓				✓	✓		1	7
Fatty acid potassium salt			✓			✓			✓			✓				1	3
Fenoxycarb									✓								60
Lambda cyhalothrin				✓									✓	✓		2	7ή14ή120 (ανάλογα με το σκείασμα και τον τρόπο ψεκασμού).
paraffin oil	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓				1/2	21
Phosmet				✓										✓		2	21
Pyriproxyfen (Δευτερεύουσα δράση στην ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ)									✓		✓					1	πριν την άνθιση
Spinetoram														✓		2	21
Spinosad				✓													14(δολ. Ψεκασμός)
Spirotetramat									✓		✓					2	14
Thiacloprid				✓												3φυλλώματος	14(δολωματικός&ψεκασμός φυλλώματος)

																	/5δολω ματικοί	
Thiacloprid +deltamethrin				✓													2φυλλ ώματος ( Δάκος- Πυρηνο τρήτης) 5δολωμ ατικοί (Δάκος)	14
urea				✓														εντομοελκυστικά
sulphur	✓																2	90 (Ακάρεα της οικ. Eriophyidae)- Πράσινη ελιά Χαλκιδικής

Ο πίνακαςείναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις(οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Καβάλα 05/03/2020