

ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ  
 (Μυκητοκτόνα)

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	Γλοιοσπόρι	Σηψιρριζία( Armillaria mellea)	Καρκίνωση	Κυκλοκόνιο	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ /ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
Azoxystrobin+ difenoconazole	✓			✓	1	Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες(εφαρμογή έως και πριν την άνθηση)
Bordeaux mixture	✓		✓	✓	2	21
Copper hydroxide	✓		✓	✓	2	21
Copper oxychloride	✓		✓	✓	2	21
Copper oxide	✓			✓	2	21
Difenoconazole	✓			✓	2	30
Dodine	✓			✓	2	7 Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες
Fenbuconazole				✓	1	εφαρμογή έως και πριν την άνθηση
Kresoxym methyl				✓	3(ελαιοπ/μες) 2(επιτραπέζιες)	Ελαιοποιήσιμες 30 Επιτραπέζιες πριν την άνθηση
Mancozeb	✓			✓	1	21
Pyraclostrobin	✓			✓	3(επιτραπέζιες) 2(ελαιοπ/μες)	105
Tebuconazole				✓	1	Επιτραπέζιες & ελαιοποιήσιμες(εφαρμογή έως και πριν την άνθηση)
Tri-basic copper sulfate	✓		✓	✓	2	21
Trichoderma		✓			2	3
Trifloxystrobin	✓			✓	2	14 (2εφαρμογές / 1μόνο κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου)
Trifloxystrobin+tebuconazole				✓	1	προληπτική εφαρμογή από την έναρξη της βλάστησης μέχρι πριν την άνθηση.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.)

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων